

別表2 セグロウリミバエ防除に用いる農薬（有機農業で使用できる農薬）

現在、農作物におけるセグロウリミバエの防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、発生ほ場では農薬の登録内容を守り、以下の農薬による防除を行うことが可能。

【ウリ科野菜】

きゅうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

すいか

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

メロン

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

とうがん

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

食用へちま

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ズッキーニ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

【ナス科野菜】

トマト

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ミニトマト

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ピーマン

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ししとう

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	20,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

【その他】

さやいんげん

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内